Clinique Saint-Luc Bouge

Paramètre	Nature échantillon	Collecte	Requis pré-analytique	Fréquence d'analyse	Délai de rendu de résultat	Stabilité du prélèvement	Délai de l'ajout d'analyse	Unités	Interprétation	Code INAMI	Cotation B/Prix	Quantité minimale par analyse	Automate	kit utilisé	Méthode d'analyse	Accréditation
Chlamydia trachomatis	Urine 1°jet (hommes)		Transport à T° amb endéans les 24h	3x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Non détecté	**Dépistage (max 2/an):** 550196-550200 **Suivi (14 jours post traitement):** 550911-550922	**Dépistage (max 2/an):** B1200 **Suivi (14 jours post traitement):** B800	2mL	Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima Combo 2®	TMA (amplification isotherme d'ARN) (Détection qualitative)	
	Frottis urogénital (Eswab®) (femmes)		Transport à T° amb endéans les 24h	3x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Non détecté	**Dépistage (max 2/an):** 550196-550200 **Suivi (14 jours post traitement):** 550911-550922	**Dépistage (max 2/an):** B1200 **Suivi (14 jours post traitement):** B800	500µL	Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima Combo 2®	TMA (amplification isotherme d'ARN) (Détection qualitative)	
Neisseria gonorrhoeae	Urine 1°jet (hommes)		Transport à T° amb endéans les 24h	3x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Non détecté	**Dépistage (max 2/an):** 550196-550200 **Suivi (14 jours post traitement):** 550911-550922	**Dépistage (max 2/an):** B1200 **Suivi (14 jours post traitement):** B800	2mL	Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima Combo 2®	TMA (amplification isotherme d'ARN) (Détection qualitative)	
	Frottis urogénital (Eswab®) (femmes)		Transport à T° amb endéans les 24h	3x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Non détecté	**Dépistage (max 2/an):** 550196-550200 **Suivi (14 jours post traitement):** 550911-550922	**Dépistage (max 2/an):** B1200 **Suivi (14 jours post traitement):** B800	500µL	Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima Combo 2®	TMA (amplification isotherme d'ARN) (Détection qualitative)	
Flu A / Flu B / RSV	Frottis nasopharyngé (Eswab®)	**OU**	Transport à T° amb endéans les 24h	7x/sem	24h	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Non détecté	RSV : 552020-552016 FluA+B facturé 50euros	RSV : B250 Rembours ement limité aux indications INAMI	500µl	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert® Xpress Flu/RSV	PCR en temps réel (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED
													Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima Flu A/B/ RSV®	PCR en temps réel (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED

Clinique Saint-Luc Bouge

Paramètre	Nature échantillon	Collecte	Requis pré-analytique	Fréquence d'analyse	Délai de rendu de résultat	Stabilité du prélèvement	Délai de l'ajout d'analyse	Unités	Interprétation	Code INAMI	Cotation B/Prix	Quantité minimale par analyse	Automate	kit utilisé	Méthode d'analyse	Accréditation
SARS-CoV-2	Frottis nasopharyngé (Eswab® ou Vacuette Virus Stabilization Tube ou VCM® Sigma)	ou	Transport à T° amb endéans les 24h	7x/sem	48h	Stockage 3 jours 2- 8°c	3 jours	/	Détecté/ Non détecté	554934-554945	B1200/Remboursement limité aux indications INAMI	500µL	EasyMAG® (biomérieux), LightCycler480® (Roche)	LightMIX Modular SARS-CoV® (Roche)	PCR en temps réel (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED
													Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima SARS-CoV-2®	TMA (amplification isotherme d'ARN) (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED
													GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert® Xpress SARS-CoV-2	PCR en temps réel (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED
													GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert® Xpress SARS-CoV-2 plus	PCR en temps réel (Détection qualitative)	
SARS-CoV-2 / FLU/ RSV plus	Frottis nasopharyngé (Eswab® ou Vacuette Virus Stabilization Tube ou VCM® Sigma)	ou	Transport à T° amb endéans les 24h	7x/sem		Stockage 3 jours 2- 8°c	3 jours	/	Détecté/ Non détecté	SARS-CoV-2: 554934- 554945- RSV: 552020-552016	B1450/ Remboursement limité aux indications INAMI	300µl	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert® Xpress SARS/Flu/RSV plus	PCR en temps réel (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED
Virus de l'hépatite B (HBV)	Plasma EDTA		Transport à T° amb endéans les 24h	2x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	UI/mL	Détecté + Quantification/ Non détecté	556776 - 556780	B3000/Remboursement limité aux indications INAMI	600µl	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert Xpress HBV Viral Load®	PCR en temps réel (Détection quantitative)	BELAC Certificat 619 MED

© Clinique St-Luc - Bouge

Clinique Saint-Luc Bouge

Paramètre	Nature échantillon	Collecte	Requis pré-analytique	Fréquence d'analyse	Délai de rendu de résultat	Stabilité du prélèvement	Délai de l'ajout d'analyse	Unités	Interprétation	Code INAMI	Cotation B/Prix	Quantité minimale par analyse	Automate	kit utilisé	Méthode d'analyse	Accréditation
Virus de l'hépatite C (HCV)	Plasma EDTA		Transport à T° amb endéans les 24h	2x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	UI/mL	Détecté +Quantification/ Non détecté	556743-566732	B3000/Remboursement limité aux indications INAMI	1000µl	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert Xpress HCV Viral Load®	PCR en temps réel (Détection quantitative)	BELAC Certificat 619 MED
Clostridium difficile toxine PCR	Selles		Transport à T° amb endéans les 24h	7x/sem	24h	Stockage 5 jours 2- 8°c	5 jours	/	Détecté/ Détecté (suspicion de souche 027 hypervirulente)/ Non détecté	/	/	Traces	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert® C. difficile BT®	PCR en temps réel (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED
Norovirus (génogroupe I et II)	Selles		Transport à T° amb endéans les 24h	7x/sem	24h	Stockage 2 jours 2- 8°c	2 jours	/	Détecté (génogroupe 1)/ Détecté (génogroupe 2)/ Non détecté	/	/	Traces	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert® Norovirus	PCR en temps réel (Détection qualitative)	BELAC Certificat 619 MED
Mycobacterium tuberculosis et sa résistance à la rifampicine	Expectorations	ou	Transport à T° amb endéans les 24h	5x/sem (jours ouvrables)	72h	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Détecté (traces)/ Non détecté/ Indéterminé	556872-556883	B2000/Remboursement limité aux indications INAMI	500µl	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert® MTB-RIF Ultra®	PCR en temps réel (Détection semi-quantitative)	BELAC Certificat 619 MED
Mutation du facteur II (G20210A de la prothrombine)	Sang total	ou	Transport à T° amb endéans les 24h	1x/2sem	15 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Présence de la mutation à l'état hétérozygot e ou homozygote /Absence de la mutation	587031-587042	B1800/Remboursement limité aux indications INAMI	200µl	EasyMAG® (biomérieux), LightCycler480® (Roche)	Realquality RS-Factor V leiden®	PCR en temps réel (Génotypage)	BELAC Certificat 619 MED
Mutation du facteur V de Leiden	Sang total	ou	Transport à T° amb endéans les 24h	1x/2sem	15 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Présence de la mutation à l'état hétérozygot e ou homozygote /Absence de la mutation	587016-587020	B1800/Remboursement limité aux indications INAMI	200µl	EasyMAG® (biomérieux), LightCycler480® (Roche)	Realquality RS-Factor II G20210A®	PCR en temps réel (Génorypage)	BELAC Certificat 619 MED

© Clinique St-Luc - Bouge

Clinique Saint-Luc Bouge

Paramètre	Nature échantillon	Collecte	Requis pré-analytique	Fréquence d'analyse	Délai de rendu de résultat	Stabilité du prélèvement	Délai de l'ajout d'analyse	Unités	Interprétation	Code INAMI	Cotation B/Prix	Quantité minimale par analyse	Automate	kit utilisé	Méthode d'analyse	Accréditation
Gène de fusion BCR-ABL p210 (T9;22)	Sang total		Transport à T° amb endéans les 24h	3x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 3 jours 2- 8°c	3 jours	% IS	Détecté (%IS) / Non détecté	588512-588523	B3500/Remboursement limité aux indications INAMI	4mL	GeneXpert ® (Cepheid)	Xpert Xpress BCR ABL Ultra®	PCR en temps réel (Détection quantitative)	
Mycoplasma genitalium	Urine 1°jet (hommes)		Transport à T° amb endéans les 24h	1x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Non détecté	/	/	2mL	Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima Mycoplasma genitalium Assay	TMA (amplification isotherme d'ARN) (Détection qualitative)	
	Frottis urogénital (Eswab®) (femmes)		Transport à T° amb endéans les 24h	1x/sem	7 jours ouvrables	Stockage 7 jours 2- 8°c	7 jours	/	Détecté/ Non détecté	/	/	500µL	Panther/Fusion® (Hologic)	Aptima Mycoplasma genitalium Assay	TMA (amplification isotherme d'ARN) (Détection qualitative)	

© Clinique St-Luc - Bouge