



La ponction lombaire

Définition:

Acte médical qui consiste à prélever du liquide céphalo-rachidien (LCR). Celui-ci est fabriqué par le cerveau et circule à l'intérieur et autour du cerveau jusqu'en bas de la colonne vertébrale.

Buts :

diagnostic (infection, maladie,...)
évacuatrice (éliminer le trop plein de LCR)

Déroulement :

- ◇ passez à la toilette avant
- ◇ assis au bord du lit, les pieds posés sur une chaise
- ◇ dos bien arrondi, un coussin dans les bras
- ◇ le médecin vous demandera de bien vous détendre
- ◇ le médecin peut alors placer son aiguille au bon endroit au bas du dos et effectuer le prélèvement
- ◇ une prise de sang sera faite ensuite

Risques :

- ◇ Des maux de tête, vertiges, vomissements sont possibles si la période d'alitement (rester coucher) n'est pas bien respectée
- ◇ Parfois, une douleur locale peut apparaître, elle est transitoire pendant 2-3 jours maximum.

Précautions immédiates après la ponction lombaire :


- ◇ rester allongé dans le lit sans lever la tête ni le dossier du lit
- ◇ durée de l'alitement est de 3 à 24h, en fonction des ordres du médecin (selon le type d'aiguille utilisée).
- ◇ après le laps de temps renseigné, le dossier du lit est redressé progressivement par l'infirmière.

Si vous souhaitez un complément d'information n'hésitez pas à poser vos questions au personnel infirmier et médical du service de neurologie.



Clinique Saint-Luc

Bouge



www.slbo.be

Tél. : 081 20 91 11

Fax : 081 20 91 98

info@slbo.be

Asbl Santé & Prévoyance

Rue Saint-Luc, 8

5004 Bouge